

衛生害虫駆除剤

シントー 水性ゴキブリート[®] 乳剤

医薬部外品



シントー水性ゴキラート[®]乳剤

特 徴

非危険物で、VOC対策になります。
 アクチゾルなどでの隙間処理に最適です。
 希釈液の安定性に優れます。
 各種衛生害虫に対し、優れた効果を示します。
 特にゴキブリに対して卓効を示します。

有効成分：ピレスロイド系殺虫剤 d・d-T-シフェノトリン

製 剤：有効成分を5%(W/W)含有する乳剤

外 観：黄褐色油状の液体

用法用量：目的に応じて水で希釈し、一般に害虫の生息または発生場所に対して使用する。

■ハエ・蚊成虫

直接噴霧：100～200倍液を通常、成虫に向けて適宜噴霧する。

■ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ

20～30倍液を50ml/m²の割合でゴキブリ等のひそみ場所、或いはよくはい廻る場所に重点的に残留塗布または噴霧する。

参 考：(シントーゴキラート乳剤Lの毒性値)

急性経口(ラット) LD₅₀：♂4,220mg/kg
 ♀3,910mg/kg

皮膚感作性(豚)：なし

眼刺激性(ウサギ)：中等度

急性経皮(ラット) LD₅₀：♂♀>2,000mg/kg

(洗浄効果あり)

急性吸入(ラット) LC₅₀：♂♀>4,970mg/m³


皮膚刺激性(ウサギ)：中等度

ゴキブリに対する効果

速効効力(ノックダウン活性)

シントー水性ゴキラート乳剤は市販品Aと比較し、ノックダウン活性ではチャバネゴキブリに対し約8倍、ワモンゴキブリに対しては8倍以上の高活性を示しました。


(直撃噴霧試験)



フラッシングアウト効力

シントー水性ゴキラート乳剤は市販品Aと比較し、チャバネゴキブリおよびワモンゴキブリに対して、ともに約4倍のフラッシングアウト効果を示しました。


(フラッシングアウト試験)



残効効力

シントー水性ゴキラート乳剤は市販品Aと比較し、チャバネゴキブリに対し2倍、ワモンゴキブリに対しては4倍の残効効果を示しました。

(ベニヤ板残効試験)



シントー水性ゴキラート乳剤：■ 市販品A：■



シントーファイン株式会社

本 社 大阪市東淀川区小松2丁目15番52号

TEL06-6328-2861

東京支店 東京都千代田区神田佐久間町
 3丁目27番地3 ガーデンパークビル7F

TEL03-5822-1381

九州営業所 熊本県熊本市常山6丁目7-136
 アベニューつるお102号

TEL096-386-8617